

Tabella dosaggio CELLFOOD® gocce:

Modalità di somministrazione. Agitare prima dell'uso e assumere almeno 10/15 minuti prima dei pasti principali.

CELLFOOD® gocce va diluito in un bicchiere di acqua oligominerale pieno (residuo fisso a 180° <50-100 mg/L), preferibilmente a pH neutro possibilmente superiore a 6.8 ad esempio **LAURETANA** seguendo un classico protocollo incrementale. Una volta effettuata l'assunzione BARRARE CON UNA X la casella vuota a fianco del dosaggio in gocce (gtt) corrispondente al giorno e all'ora: (mattina, pomeriggio, sera). Il seguente schema posologico è facoltativo ma anche importante per una lenta disintossicazione e adattamento.

Schema posologico	Mattino			Pomeriggio			Sera		
1° - 2° - 3° giorno	1 gtt			1 gtt			1 gtt		
4° - 5° - 6° giorno **	2 gtt			2 gtt			2 gtt		
7° - 8° - 9° giorno	3 gtt			3 gtt			3 gtt		
10° - 11° - 12° giorno	4 gtt			4 gtt			4 gtt		
13° giorno	5 gocce			5 gocce			5 gocce		
14° giorno	6 gocce			6 gocce			6 gocce		
15° giorno	7 gocce			7 gocce			7 gocce		
Dal 16° giorno mantenere il dosaggio per un protocollo disintossicante e antiossidante di 3 mesi oppure vedi periodo in mesi di trattamento *	8 gocce			8 gocce			8 gocce		
Protocollo specifico	Mattino			Pomeriggio			Sera		
17° - 18° - 19° giorno (e nei giorni di riposo)	8 gtt			8 gtt			8 gtt		
20°-21°-22° giorno	8 gtt			8 gtt			8 gtt		
23° - 24° - 25° giorno incremento	9 gtt			9 gtt			9 gtt		
26° - 27° - 28° giorno incremento	10 gtt			10 gtt			10 gtt		
29° - 30° -31° giorno incremento	11 gtt			11 gtt			11 gtt		
32° giorno incremento	12 gtt			12 gtt			12 gtt		
33° giorno incremento	13 gtt			13 gtt			13 gtt		
34° giorno incremento	14 gtt			14 gtt			14 gtt		
35° giorno incremento	15 gtt			15 gtt			15 gtt		
36° giorno incremento	16 gtt			16 gtt			16 gtt		
Incremento tutti i giorni di una goccia fino alle 25 x 3 oppure 20 x 6	17 gtt			17 gtt			17 gtt		
Si possono raggiungere anche 20 gocce 6 volte la giorno	25 gtt			25 gtt			25 gtt		
Dosaggio di supporto in caso di complicazione	Colazione	Mattino	Prezno	Pomeriggio	Cena	Ore			
Orario indicativo per assunzione del prodotto	8	11	13	17	19,30	22,30			
Quantità in gocce	20	20	20	20	20	20			
Fibromialgia: indicare il dosaggio	12	1	16	12	14	16	12	14	16
Seguendo il protocollo N. 1 arrivare per esempio 12o 14o 16 gocce x 3 volte al giorno									
Si consiglia un minimo di 3 mesi * Durata del trattamento in mesi:	3	6	9	12	15	18	21	24	36

Importante:

Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono a solo scopo informativo e non sono da usare come mezzo per diagnosticare o curare una malattia. Tutto ciò che riguarda la salute fisica e mentale deve essere trattato da un medico di provata competenza nel trattamento di quella specifica malattia. Sia l'editore che gli autori si astengono dal dispensare consigli medici, direttamente o indirettamente, nonché dal prescrivere qualsiasi cura e non si assumono alcuna responsabilità nei confronti di coloro che scelgono di curarsi da soli.

Per informazioni: numero verde 800650800 Data inizio assunzione _____